

¿Es Influenza (gripe), un resfriado, o tosferina?

Síntomas		Gripe	Resfriado	Tosferina
Fiebre		Suele aparecer y es alta (102 a 104°F o 39 a 40°C); normalmente dura unos 3 o 4 días	Poco frecuente en adultos y niños mayores	Poco frecuente. Si se presenta, suele ser ligera (99.5 a 100.4°F o 37.5 a 38°C)
Dolor de cabeza		Muy común	Poco frecuente	Poco frecuente
Malestar general, dolores musculares, molestias en el pecho		Comunes, a menudo intensos	Entre ligeros y moderados	Poco frecuente
Fatiga y debilidad		Entre moderadas e intensas; pueden durar hasta 14-21 días	Ligeras	Entre ligeras y moderadas
Agotamiento extremo		Muy común, al principio de la enfermedad	Muy poco frecuente	Inusual
Nariz tapada o con secreción		A veces	Común	Común, al principio de la enfermedad
Estornudos		A veces	Comunes	Comunes, al principio de la enfermedad
Dolor de garganta		A veces	Común	Poco frecuente
Tos	Tipo	Es típica la tos improductiva ("seca"); la tos nocturna es inusual	Tos fuerte y seca, a menudo productiva; la tos nocturna es inusual; suele responder a los medicamentos contra la tos	Variable; son comunes los ataques y los golpes de tos, así como la tos nocturna; sonido característico de "silbido" agudo, que no suele responder a los medicamentos contra la tos
	Intensidad	Moderada	Entre ligera y moderada	Variable; puede ser ligera en adultos, y muy intensa en los bebés y niños pequeños
	Duración	Normalmente, entre 3 a 7 días; en ocasiones, hasta 14 días	Normalmente, entre 3 a 7 días	Tos persistente, casi siempre durante más de 1 semana, normalmente entre 2 a 6 semanas, a veces más de 10 semanas
	Ataques / Golpes de tos	Poco frecuente	Inusuales	Comunes
Período contagioso		Desde 1 a 2 días antes de que aparezcan los síntomas hasta entre 5 a 10 días después	Variable; normalmente, entre 4 a 7 días después de que aparezcan los	Desde que empieza a aumentar la producción de mucosidad (antes de que empiece la tos) hasta 21 días

* o hasta que se hayan tomado antibióticos adecuados contra la tosferina durante cinco días.

